

# العلاج الكيميائي في حالات العلاج الكيميائي لسرطان الثدي كيفية التعايش مع الآثار الجانبية؟



Arabisch

## رسالة

استخدم العلاج الكيميائي لأكثر من ٦٠ عاماً لمكافحة مرض السرطان.

وقد انتهت منذ فترة طويلة الأيام التي أعتبر فيها العلاج الكيميائي الأمل الأخير لمرضى السرطان، كما تم توسيع مجال تطبيق العلاجات الجديدة في مراحل المرض المبكرة، ومن ثم فقد استخدمت العلاجات المساعدة (راجع مسرد المصطلحات) لضمان نجاح الطريقة العلاجية، كما استخدمت العلاجات المساعدة الجديدة (راجع مسرد المصطلحات) قبل العمليات الجراحية.

ساعدت العناصر والمكونات الأساسية الجديدة في تعزيز الخطط العلاجية وجعل الخيارات العلاجية الجديدة خيارات ممكنة، وقد يعني ذلك إطالة أممار المرضى وتحسين نوعية حياتهم في كثير من الأحيان، وفي النهاية يجب ألا ينسى الماء أن الأورام ونَقائِلُهَا تؤثِّر سلباً على نوعية حياة المرضى.

يُعد العلاج الكيميائي من العلاجات المجهدة والمؤثرة على حياة المرضى؛ لذا يحاول الأطباء تقليل الآثار الجانبية من خلال وصف علاجات مساعدة، لذلك تم إجمال النصائح التي يمكن أن تتبعها بنفسك لتقليل الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للعلاج الكيميائي في هذا الكتاب.

مع أطيب تمنيات شركة Eisai GmbH بالشفاء العاجل.

## ما هو العلاج الكيميائي؟

يُشير العلاج الكيميائي إلى علاج السرطان بعقاقير مثبتة للخلايا، أي استخدام مواد طبيعية أو اصطناعية لمنع نمو الخلايا، ويستخدم الأطباء أحياناً مصطلح العلاج الكيميائي عند علاج الالتهابات أو العدوى، ويدور موضوع هذا الكتيب حول استخدام العلاج الكيميائي لعلاج سرطان الثدي.

## كيف تعمل مثبطات الخلايا؟

قمنع العقاقير المثبتة للخلايا المستخدمة في العلاج الكيميائي نمو الخلايا، وذلك عن طريق تعطيل العمليات المرتبطة بانقسام الخلايا أو فوها.

تنقسم الخلايا السرطانية بسرعة كبيرة وبصورة يصعب التحكم فيها، تكون أكثر حساسية للمواد المثبتة مقارنة بالخلايا السليمة، كما تمتلك الخلايا السليمة آلية إصلاح لا تمتلكها الخلايا السرطانية.

وعلى الرغم من ذلك تتأثر الأنسجة السليمة في كل جلسة من جلسات العلاج الكيميائي، وخاصة تلك الأنسجة والأعضاء التي تتجدد بسرعة كبيرة، وينقسم فيها عدد كبير من الخلايا نتيجة لذلك، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الخلايا المكونة للدم أو الأغشية المخاطية، ولذلك ترتبط فعالية العقاقير المثبتة للمناعة وأثارها الجانبية ارتباطاً وثيقاً.



انقسام الخلايا: قمنع معظم مثبطات الخلايا فهو الخلايا السرطانية عن طريق تعطيل انقسام الخلايا.

## كيف تُستخدم مثبطات الخلايا؟

تختلف العوامل المنشطة للخلايا من حيث نشأتها وطريقة عملها، فبعض العوامل هي مركبات محددة كيميائياً، والبعض الآخر له أصل في المملكة النباتية أو الحيوانية. وتعطي الجرعة المحددة من كل منها الأثر العلاجي المطلوب، ولكن في حالة إعطاء المريض جرعة صغيرة للغاية، فلن يتم قتل الخلايا السرطانية بالكامل، ويحدث العكس في حالة إعطائه جرعة كبيرة للغاية، حيث تتضرر الخلايا السليمة بصورة لا يمكن إصلاحها.

يلزم في حالات العلاج الكيميائي إيقاف العلاج لفترات معينة بحيث يتم السماح للخلايا السليمة بالتعافي، وفي تلك الفترة يبدأ انقسام الخلايا السرطانية، والتي تكون أكثر حساسية للعقاقير المنشطة للخلايا؛ لذلك عادة ما تحصل المريضة على جرعات متتالية، ثم يتوقف العلاج لفترة حتى يأتي موعد الجرعة التالية، ويُطلق على الفترة التي تبدأ من امْلَدُّ خُولُّ الأول إلى نهاية الفترة الفاصلة «دورة العلاج».

لا يعتمد الأمر على إعطاء المريضة الجرعة الصحيحة أو المدخلات الصحيحة فحسب، إذ يوجد في عدد كبير من العقاقير المنشطة للخلايا عدد من المضادات الفاعلة التي تُوجّه إلى جانب المكونات النشطة الفعلية لعلاج الخلايا السرطانية، وتزيد فعالية بعض العقاقير المنشطة للخلايا أو يتحملها الجسم بصورة أفضل عندما تُعطى بجرعات منخفضة مع عقاقير منشطة أخرى.

يُشار للجرعات ودورة العلاج معاً بـ «خطة العلاج الكيميائي»، ولا ييدو هذا المصطلح قاسياً دون مبرر، فمع العلاج الكيميائي تتراوح الحريات إلى أبعد الحدود.

## ما هدف العلاج الكيميائي؟

يعتمد هدف العلاج الكيميائي على مرحلة المرض وطبيعة العلاج المخصص للحالة، ويفضل في بعض الحالات البدء بالعلاج الكيميائي بمفرده حتى قبل الاستئصال الجراحي للورم، ويهدف استخدام ما يطلق عليه العلاج الكيميائي المساعد إلى تقليل حجم الورم وتسهيل عملية إزالته، وأصبح ممكناً بوجه عام إجراء عمليات جراحية باستخدام علاجات مساعدة جديدة، ويمكن في حالات أخرى استخدام علاجات كيميائية جديدة بكميات قليلة بحيث يمكن الاحتفاظ بالثدي في معظم الحالات.

يستخدم ما يطلق عليه العلاج الكيميائي المساعد بعد فترة قصيرة من إزالة الورم بعملية جراحية، ويهدف هذا العلاج إلى القضاء التام على الخلايا السرطانية المتبقية بعد العملية ومن ثم الشفاء من السرطان، وتكون صعوبة علاج مرض السرطان في أن ترك خلية سرطانية واحدة فقط يكفي لعوده المرض.

وحتى لو بدا أن الورم قد قمت إزالته تماماً، فما زال هناك فرصة في أن يبقى امتداد ميكروسكوبى واحد في الخلية، ويمكن أن تخفي أيّضاً أصغر مستوطنات الخلايا السرطانية، وهي ما يطلق عليها النّقائِل الدقيقة، في أي جزء من الجسم ولا يمكن اكتشافها بأي وسيلة من وسائل التصوير؛ لذلك يُستخدم العلاج الكيميائي المساعد إجراء وقائي للتخلص من تلك الخلايا أيّضاً.

يُستخدم العلاج الكيميائي في مراحل متقدمة من سرطان الثدي لتقليل حجم الورم والنّقائِل التابعة له، ومن ثم الإبقاء على حالة سكون المرض؛ وتظل هذه الطريقة جيدة لفترة ما، وإذا فُقدَ العقار المنشط للخلايا فاعليته، فييمكن استخدام مكونات نشطة أخرى. وبذلك يتوفّر لدى المرضى خيارات متعددة لعلاج السرطان، ويتم غالباً ترتيبها على التوالي، ويشار إليها بخطبة العلاج الأولى وخطة العلاج الثانية وهكذا.


يُستخدم العلاج الكيميائي في مراحل مختلفة من علاج سرطان الثدي.

## العلاج بالأقراص أم بالتسريب؟

توفر العقاقير المشبطة للخلايا في هيئة أقراص أو حقن أو حقن بالتسريب، ولا يؤثر اختلاف شكل الجرعة على كفاءة العقار المشبط للخلايا أو درجة تحمله.

قد يكون من المفيد عمل ما يسمى “بُوباء” في أجسام المرضى الذين يحتاجون للحقن الوريدي بمثبطات الخلايا على فترات متقاربة أو ملدد طويلة، والبُوباء هو عبارة عن مبيت معدني صغير (حجيرة/مستودع)، يُشق غالباً تحت الترقوة أسفل الجلد، ومن هناك يتم إدخال أنبوب رفيع في وريد واسع، ويشعر المريض بوجود تلك الحجيرة من خلال الجلد، وتغلق عند الجزء العلوي منها بغشاء من السليكون، وبذلك يمكن إدخال الدواء إليها مباشرة من خلال وخز الجلد، وفي هذه الحالة تُخصص أوردة معينة في الذراع لتفادي خطر إدخال الإبرة في غير مكانها الصحيح.

تُعطى العقاقير المشبطة للخلايا بطرق علاجية مختلفة، ولا تتأثر فعالية الدواء أو تحمل المريض له بسبب هيئة الجرعة المقدمة.



يسهل نظام البوباء المزروع في الجسم عملية إدخال العقاقير المشبطة للخلايا.

## ما هي المقاومة؟

يُطلق على الحالة التي لا تستجيب فيها الخلايا السرطانية للعلاج بمثبطات الخلايا المقاومة، وهي الحالة التي عادة ما يستجيب فيها الورم للعلاج بصورة جيدة، ثم تزاجع فعالية العلاج بصورة ملحوظة في فترة لاحقة، والسبب في ذلك هو تأقلم الورم مع مثبطات الخلايا.

يؤدي أيضًا انقسام ملائين الخلايا إلى تغييرات دائمة في جينوم الخلية، وهو ما يطلق عليه الطفرات، ومعظم هذه الطفرات غير قابل للبقاء، ولكن بعضها أيضًا يعطي الخلايا فرصة الحياة، وفي حالة كان هناك طفرة تجعل خلية سرطانية واحدة أقل حساسية لمثبطات الخلايا، ستتجه الخلية السرطانية الطافرة في وقت أقرب من باقي الخلايا، وقد تتكاثر، بينما تموت الآخريات.

وتحتوي جميع الخلايا المتبقية في مرحلة معينة على الطفرة التي تجعلها حساسة للعلاج الكيميائي؛ لأنها تكون من غير المعقول في تلك المرحلة على الأقل أن يستمر العلاج الكيميائي السابق، ويجب حينئذ التغيير إلى طريقة علاجية أخرى، كما ينبغي أن تتم التحضيرات الجديدة بأية تختلف عن طريقة العلاج الكيميائي السابق طالما كان ذلك ممكناً.

ومن جهة أخرى تقلل هذه الطريقة من احتمالية مقاومة الخلايا السرطانية للعلاج الجديد، ولكن -للأسف- لا يوجد حتى الآن اختبار موثوق يؤدي إلى توقع ما إذا كان الورم سيستجيب للعقار أم لا ولذلك لا يتتوفر خيار آخر غير استغلال الخبرات المكتسبة من الدراسات واختبار المواد الفعالة على حالات فردية.

المقاومة تجعل مثبطات الخلايا غير فعالة؛ ولذلك يتغير التحول إلى عامل مثبط آخر بأية عمل مختلفة.

## ■ ■ ■ لماذا توجد آثار جانبية للعلاج الكيميائي؟

ذكرنا سابقاً أن فعالية العقاقير المرتبطة للمناعة وأثارها الجانبية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً، إذ يظهر أثر العقار والآثار الجانبية المرتبطة بتناوله بسبب منع انقسام الخلايا، ويؤثر منع انقسام الخلايا هذا على جميع الأعضاء التي تتجدد بسرعة كبيرة وتتقسم خلاياها بسرعة كبيرة أيضاً، وهذا يشمل الخلايا السرطانية وكذلك خلايا الدم أو الأمعاء أو خلايا جذور الشعر.

يرجع مدى شدة الآثار الجانبية وأي الأعضاء التي تتأثر بالعلاج إلى عدة عوامل، حيث يلعب كل من نوع العلاج والعوامل الشخصية والطبية دوراً أساسياً في ذلك، فمن غير الممكن في أغلب الحالات تجنب بعض الآثار الجانبية مثل سقوط الشعر، ولكن يمكن تخفيف أعراض أخرى مثل الغثيان بوصف أدوية إضافية.

الآثار الجانبية هي بمثابة نتائج مباشرة للأثر العلاجي للعقار، وتدل على بدء عمله في الجسم.



## ■ ■ ■ ما هي العلاجات المساعدة؟

تهدف العلاجات المساعدة في حالات التداوي بالعلاج الكيميائي إلى جعل الآثار الجانبية أقل حدة أو تجنب الآثار الجانبية الخطيرة، وتشمل العلاجات المساعدة الأدوية التي تساعد على تجنب التقيؤ أو منع الشعور بالغثيان.

وفي حالة إمكانية تعرض المريضة لأعراض نقص المناعة في وقت قريب، يمكن تحفيز تشكيل كرات الدم البيضاء باستخدام أدوية معينة؛ وفي حالات فقر الدم وما يصاحب ذلك من حالات الإجهاد (التعب، انظر مفرد المصطلحات)، يمكن التغلب على ذلك بإعطاء المريضة مستحضرات الحديد والإريثروبويتين (EPO).

في حالة ظهور أي آثار جانبية خلال فترة العلاج الكيميائي، يجب داعماً إخبار الطبيب المختص ومسؤوله عن خيارات العلاج.

## **نصائح أساسية في حالة ضرورة تكرار العلاج الكيميائي**

في حالة ضرورة تكرار العلاج الكيميائي، يمكن اتباع نفس الخطة العلاجية أو استخدام طريقة علاجية جديدة، ويُتوقع في حالة استخدام نفس الطريقة أن تظهر نفس الآثار الجانبية التي ظهرت من قبل، وفي حالة عدم تقبل أي من الآثار الجانبية السابقة، يجب إخبار الطبيب بذلك، فربما يكون هناك علاج مساعد لم يستخدم في المرة السابقة.

يجب أن تخبر الطبيب المعالج في حال ظهور أعراض جديدة لم تشعرين بها من قبل خلال فترة العلاج الكيميائي السابق، فقد لا يتحمل جسدك العلاج كما تحمله في المرة الأولى، وقد تظهر أعراض الحساسية تجاه العقار في بعض الحالات؛ وغالباً ما تظهر أعراض الحساسية المفقرطة لمستحضرات معينة خلال العلاج بالتسريب، وتظهر في صورة ضيق التنفس أو أعراض تحسّس الجلد أو اضطراب الدورة الدموية (عدم انتظام ضربات القلب، شحوب البشرة، العرق البارد، الدوخة الشديدة).

قد تظهر آثار جانبية جديدة مع استخدام نظام علاجي جديد، وتحذث معظم العقاقير المشبطة للخلايا آثاراً جانبية ثانوية، إضافة إلى تأثيرها المتمثل في منع انقسام الخلايا، لذلك يجب سؤال الطبيب عما إذا كان يمكن التنبؤ بالآثار الجانبية للعلاج الكيميائي الجديد.

ويمكن سؤال الطبيب، في حالة استخدام علاج كيميائي آخر، عن إمكانية الموازنة بين الفوائد والآثار الجانبية المصاحبة حيث يلعب ذلك دوراً هاماً في حياة المرضى، إذ تتراجع جودة الحياة بصورة ملحوظة بسبب الآثار الجانبية للعلاج. ومع ذلك لا ينبغي أن ينسى الممرء أن العلاج الكيميائي الناجح لا يطيل عمر المريض فحسب، ولكنه يحسن أيضاً نوعية الحياة من خلال الحد من أعراض التورم والنفاث.

## نصائح حول التعامل مع الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي

الجميع يعرف ما يلي: يصبح الشيء أكثر أهمية كلما زاد التركيز عليه، وينطبق نفس الأمر على الآثار الجانبية، فكلما تمكن المريض من إلهاء نفسه، قلت المخاناة.

يمكن أن يساعد التفكير الإيجابي في جعل الآثار الجانبية أقل وطأة، كما يمكن أن يساعد، على سبيل المثال، في تذكر أن الآثار الجانبية هي مرحلة مؤقتة وهي دليل على محاربة العقار للورم، ولكن يجب مناقشة الطبيب بخصوص الآثار الجانبية على أي حال.

## نصائح عامة للتعايش مع الآثار الجانبية

تناول الأدوية المخصصة للتغلب على الآثار الجانبية بصورة منتظمة، ولا تنتظري حدوثها.

حاولي إلهاء نفسك، وفكري بصورة إيجابية.

كافئي نفسك بصورة منتظمة.

اخرجي في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك، ومارسي تمارينات رياضية بانتظام.

احرصي على تناول طعام صحي شهي، وذلك من خلال تقسيم الوجبات إلى خمس وجبات صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

احصللي على قدر كافي من النوم.

تجنبي السجائر والكحوليات، أو تناولي كميات صغيرة قدر الإمكان.

تجنبي التعرض المطول لأشعة الشمس.

احرصي على ممارسة الرياضة  
حسب قدرتك، فهذا يقلل من  
الآثار الجانبية، ويزيد من الشعور  
بالصحة، ويقلل مخاطر الالتفاس.



## تغيرات صورة الدم

يقوم الدم بعدة وظائف، ويشمل ذلك مكافحة العدوى والإرقاء وتزويد الأعضاء بالأكسجين؛ وتكون كرات الدم البيضاء مسؤولة عن مكافحة العدوى، بينما تقوم الصفائح الدموية بعملية الإرقاء، وتقوم كرات الدم الحمراء بنقل الأكسجين.

وتزيد مخاطر العدوى أو زيادة احتمالات نزف الدم أو الشعور بالإجهاد الذى يشار إليه أيضًا بالتعب واستناداً إلى مكون الدم الذى تقل نسبته.

## تجنب العدوى

- تجنب الأماكن المزدحمة أو التواجد بصحبة شخص أو حيوان مريض.
  - تجنب الجلوس في غرف بها عفن (الأقبية الرطبة).
  - أغسل يديك بصورة منتظمة وشاملة.
- استشيري الطبيب على الفور في حالة الإصابة بعدوى.

## يجب إخبار الطبيب في حالة ظهور العلامات التالية:


- ارتفاع درجة الحرارة إلى ٣٨ درجة مئوية أو أكثر.
- الإحساس بصعوبة البلع، احتقان الزور، السعال، ضيق النفس.
- الإصابة بالاسهال.
- الشعور بالألم عند التبول أو تكراره بصورة غير معتادة.

## تجنب الإصابات ونزع الدم

- ارتدي قفازات مناسبة عند ممارسة نشاط البستنة -على سبيل المثال- لتجنب الإصابات.
- تجنبي تناول الكحول؛ لأنه يقلل من المنسكّسات ويزيّد من خطر الإصابة.
- استخدمي فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان معتدل، وتتجنبي استخدام غسول فم قوي إذا لزم الأمر.

## التعامل مع حالات الإجهاد (التعب)

- يمكن أن يرجع سبب الإجهاد إلى نقص كرات الدم الحمراء (القابل للعلاج)، ويجب في هذه الحالة أن تتحدثي إلى الطبيب المعالج عن حالة الإجهاد لديك.
- تحدي إلى أقاربك ومعارفك عن حالة الإجهاد لديك.
- قسمّي طاقتكم، وخذلي قدرًا كافيًّا من الراحة. كوني صبورًّا!
- حاولي أن تجعلي الأنشطة أقل إرهاقًا (أن تقومي بكي الملابس في وضع الجلوس).
- حافظي على ممارسة الأنشطة المختلفة قدر الإمكان، وذلك لأنّ الحماية المفرطة يمكن أن تزيد من الشعور بالتعب.
- مارسي رياضات التحمل الخفيفة، فهي تساعدي في مقاومة الشعور بالتعب، ولكن لا تفرطي في ذلك!



■ قد كريات الدم أعضاء الجسم بالأشجان وتحارب العدو، فيما يمنع العلاج الكيميائي تشكُّلها.

## تساقط الشعر

يبدأ تساقط الشعر عادةً في الأسبوع الثاني إلى الثالث من بداية العلاج، وقد يتتساقط الشعر بصورة مفاجئة؛ مما يؤدي إلى فقدان الشعر سريعاً، أو يحدث التتساقط بصورة متدرجة، وفي بعض الحالات لا يتتساقط شعر الرأس فحسب، بل قد يتتساقط أيضاً من مناطق أخرى كالحواجب والرموش وتحت الإبطين أو من الجسم كله بوجه عام، وفي أغلب الأحيان ينمو الشعر بصورة الطبيعية بعد توقف العلاج الكيميائي.

## نصائح حول تساقط الشعر

- اختاري شعراً مستعاراً يشبه شعرك العادي قبل بدء العلاج، إذ يتکفل التأمين الصحي بتلك المصروفات جزئياً، واطلبي من مصفف الشعر أن يُعد شعراً مستعاراً يشبه شعرك الأصلي.
- لا تخسلي شعرك كثيراً، واستخدمي شامبو لطيفاً (شامبو الأطفال على سبيل المثال) وفرشاة شعر ناعمة.
- لا تفركي شعرك بقوة كي يجف، ولكن اضغطي عليه بمنشفة ناعمة، ودعيه يجف في الهواء، ويفكر استخدام مجفف شعر ساخن بدرجة معقولة.
- لا تستخدمي مكواة الشعر أو أدوات تجعيد الشعر القابلة للتسخين.
- لا تستخدمي الصبغات أو المستحضرات الملموحة للشعر. قصي شعرك لجعله قصيراً جداً في حالة تساقطه.
- بسرعة كبيرة. نصائح بسيطة: يمكن أن تحتفظي بخصلات من شعرك كي تلصقها بطرف رأسك، وبذلك يبدو أن لديك شعراً حقيقياً.
- إذا كان ما يزال لديك شعر خفيث، فقومي بتغطية رأسك عند الخروج من المنزل بقبعة أو إيشارب أو شعر مستعار لحمايتك من حرارة الشمس أو الحرارة أو البرودة.
- توجّهي إلى مراكز سلطان الثدي في حالة تساقط شعر الحواجب والرموش، فهناك ستتخلصين على دورة مخصصة للتغلب على تلك المشكلة.

## التغيرات التي تطرأ على هيئة البشرة والأظافر

تحدث تغيرات في هيئة البشرة والأظافر خلال فترة العلاج الكيميائي، وتتمثل العلامات الأولى في تبقع الجلد واحمراره. تليّن الجروح والإصابات بوجه عام، وقد تظهر الأظافر بلون ملطف.

### نصائح حول مشكلات الجلد والأظافر

- استخدمي فقط الماء الفاتر والصابون الخالي من المواد الكيميائية وغسولاً منظفاً معتدلاً لتطهير الجلد.
- تجنبي تعريض الجلد للماء لوقت طويل أو الاستحمام بماء ساخن جداً أو استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكحول؛ حيث سيتسبب ذلك في جفاف الجلد.
- تجنبي الحرارة والتعرق والتعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- تجنبي ملامسة سوائل التنظيف للجلد مباشرة.
- احرصي على عدم إزالة الشعر قدر الإمكان.
- تجنبي ارتداء الملابس الضيقة أو الخشنة.
- احرصي على تقليل الأظافر باستمرار، حتى لا تكون عرضة للكسر.
- احرصي على تغطية البقع الموجودة على الأظافر باستخدام طلاء الأظافر.



يمكن أن تؤدي الملامسة المباشرة لسوائل التنظيف أو مواد التنظيف إلى ظهور مشكلات في الجلد.

## متلازمة اليد والقدم

يظهر هذا الأثر الجانبي أولاً في صورة احمرار الجلد واضطرابات حسية في راحة اليد وبطن القدم، ثم يضاف إلى ذلك في وقت لاحق التورم والشعور بالألم، بينما تتشكل البثور ويتشقر الجلد في الحالات المتقدمة، وقد يتسبب ذلك في الشعور بألم شديد.

## نصائح حول متلازمة اليد والقدم

■ تجنبِي تعريض كفَّي اليدين وأخمصِي القدمين للإجهاد الميكانيكي المطول (مثل استخدام الأدوات الرياضية أو المشي).

■ احرصي على ارتداء أحذية مريحة أو كشف القدمين أو اليدين تماماً إذا كان ذلك ممكناً.

■ قبل البدء في العلاج احرصي على علاج الزوائد الجلدية السميكة جداً في القدمين واليدين من خلال الاستعانته ببني باديكيير أو مانيكيير محترف.

■ تجنبِي التعرض للحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

■ تجنبِي استخدام الماء الساخن جداً عند الاستحمام أو التنظيف.

## الغثيان والقيء

تؤدي معظم مشكلات الخلايا إلى الشعور بالغثيان والقيء، إلا أن هناك بعض الأدوية الفعالة التي تساعد في التغلب على هذه الآثار الجانبية، ويجب أن تُؤخذ هذه الأدوية وقايتاً وليس فقط عند الشعور بالغثيان، كما تجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه الأدوية الوقائية يمنع ارتباط العلاج الكيميائي اللاوعي بالشعور بالغثيان.

على سبيل المثال قد يفيد تناول جرعة وقاية في حالة الشعور بالغثيان نتيجة العلاج الكيميائي السابق، ويدرك أيضاً أن النساء اللواتي يعانين من زيادة الغثيان في الحمل عرضة لرد فعل مماثل عند تناول العلاج الكيميائي.

## نصائح حول الغثيان

- يجب أن تتناول المريضة الوجبات الخفيفة فقط في أيام تسريب العلاج الكيميائي ولبضعة أيام لاحقة.
- يُنصح بتناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من الثلاث وجبات المعتادة.
- احرصي على أخذ قسط من الراحة بعد تناول وجبات الطعام.
- احرصي على مص الحلوي ذات المذاق الطيب.
- اشربي الزنجبيل على فترات منتظمة (ضعى كمية وفيرة من الزنجبيل الطازج على الماء المثلجي، واتركيه لمدة خمس إلى عشر دقائق).
- تجنّبي التعرض للروائح الكريهة، واحرصي على تهوية مسكنك بانتظام.
- احرصي على الحصول على كمية وفيرة من الهواء النقي مع ضمان النوم الكافي إذا كان ذلك ممكّناً.

## نصائح حول القيء

- يمكن أن تضر أحماض المعدة بالأسنان؛ لذا احرصي على شطف الفم تماماً بالماء بعد التقيؤ.
- يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل أثناء القيء الشديد؛ لذا يُنصح بالتغلب على هذا الفقد من خلال إمداد الجسم بالترطيب الكافي.
- يمكن أن يقلل امتصاص مكعبات الثلج أو قطع الفاكهة المجمدة من الغثيان وتعويض خسارة السوائل.
- في حالة التقيؤ بصورة متكررة، انتظري من 4 إلى 8 ساعات قبل تناول الأطعمة الصلبة.

## فقدان الشهية

قد تعاني مريضة سرطان الثدي من فقدان الشهية أثناء العلاج بثقبات الخلايا؛ ويرجع ذلك إلى الشعور الدائم بالغثيان أو اضطرابات التذوق أو اضطرابات الإحساس بالشبع أو المشكلات النفسية، وتتجذر الإشارة إلى أن التغذية الكافية مهمة جدًا لمريض السرطان بوجه عام، حيث تساعدك على التصدي لأعراض المرض.

## نصائح حول فقدان الشهية

- احرصي على تناول الطعام كلما شعرت بالرغبة في ذلك.
- حاوي تناول الأطعمة المفضلة لديك.
- أضيفي التوابل المفضلة إلى طعامك.
- مارسي الرياضة في الهواء النقي قبل تناول الطعام حيث إنها تحفز الشهية.
- اشربي أقل قدر ممكن من الماء خلال تناول الطعام؛ حتى لا تمتلئ معدتك بالسوائل.

## اضطرابات التذوق

يمكن أن تغير العلاجات الكيميائية الإحساس بالمزاق، إلا أنه بعد الانتهاء من العلاج عادةً ما يختفي هذا الأثر الجاني.

## نصائح حول اضطرابات التذوق

- تجنبي تناول الأطعمة التي لا تحببينها.
- احرصي على شرب كميات قليلة من المشروبات للتغلب على الطعم السيء.
- اغسلي فمك لفترة وجيزة قبل تناول الطعام.
- احرصي على تحفيز تدفق اللعاب من خلال تناول المشروبات اللاذعة (ماء التونيك أو الليمون اللاذع أو الشاي الأسود) أو المشروبات بنكهة الليمون أو الحلويات أو العلكة.

وصفة مخصصة لك

إفطار التوت - مشروب السموذى

نود أن نقدم لك وصفة بسيطة ستحمّلها بدأية شطّة ليلٍ يوم جديد، تكفي المقادير لصنع كأسين كبيرين سعة ٢٥٠ مل، أو أربعة كوبوس صغيرة سعة ١٢٠ مل، (وصفة سهلة جدًا).



- ١٠٠ جرام زبادي
- ٢٢٥ جراماً من خليط التفاح وعصير التوت البري
- ١ شريحة من الأناناس
- ٢٢٥ جراماً من التوت الم凍 المجمد
- ١٠٠ جرام فراولة

ضعى المكونات في الخليط وامزجها حتى الحصول على خليط كريمي.

في حالة الرغبة في الحصول على خليط كريمي بشكل أكبر، يمكنك إضافة المزيد من الزبادي، كما أن إضافة التلنج يجعل العصير أكثر سماكة.

يحتوي كل كأس على العديد من الفيتامينات و ٩ جرامات من البروتين و ٣٢٠ سعرًا حراريًّا.  
شهية طيبة!

معلومات غذائية

			<	%١٠٠ <		بوتاسيوم				<	فيتامين سي
				%١٠٠-٨٠		مغنيسيوم				<	فيتامين بي٦
				%٧٩-٦٠		نحاس					كالسيوم
				%٥٩-٤٠		يود					ألياف غذائية
				%٣٩-٢٠		فيتامين بي١					(سكريات)
						فيتامين بي٢					غير نشوية)
						بروتينات					يود

## التهابات الفم

قد تصاب المريضة خلال العلاج الكيميائي باحمرار والتهاب مؤلم في الفم، وعلى الرغم من أن هذه الالتهابات تكون مزعجة، إلا أنها ليست خطيرة.

### نصائح حول التهابات الفم

- تجنبِي استخدام الكحول أو غسول الفم اللاذع، بدلاً من ذلك استخدامي البابونج أو شاي الميرمية.
- احرصي على تناول العديد من منتجات الألبان.
- حافظي على ترطيب شفتيك بانتظام باستخدام بلسم الشفاه.
- احرصي على تحفيز تدفق اللعاب مع خلال تناول الحلوي الخالية من السكر أو العلكة.
- تجنبِي تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية جداً.
- احرصي على عدم تناول الأطعمة الحارة.
- تجنبِي تناول الأطعمة ذات الأطراف الحادة، مثل قشور الخبز أو رقائق البطاطس أو البقسماط.
- تجنبِي غسل الفم بالياء الساخن، واحرصي أيضاً على تبريد الأطعمة والمشروبات الساخنة بالقدر الكافي قبل تناولها.
- تجنبِي تناول الكحول وتدخين السجائر قدر الإمكان.
- في حال الإصابة بعدوى فطرية، يُنصح بتناول الأدوية الموصوفة بانتظام.

## الإسهال

قد تصاب مريضة سرطان الثدي بالإسهال نتيجة العلاج الكيميائي نفسه، ولكن يمكن أيضًا أن ينبع عن الإصابة بعدوى بكتيرية، وفي كلا الحالتين يؤدي الإسهال الشديد والمطول إلى الإصابة بالجفاف، إضافة إلى انخفاض كمية السوائل بالجسم مما يتطلب عناية طبية خاصة.

لذا يجب استشارة الطبيب على الفور في حال التعرض للإسهال سائل أكثر من ثلاثة مرات يوميًّا أو وجود إسهال مرتبط بالحمى، حيث يمكن علاجه بطريقة أسهل من خلال تناول الأدوية المطابقة.

## نصائح لمواجهة الإسهال

- يمكن أن يخفف استعمال البروبوتين قبل العلاج الكيميائي وأثناءه من أعراض الإصابة بالإسهال.
- حاولي اتباع نظام غذائي خفيف ومنخفض الدسم ومنخفض الألياف.
- احرصي على تناول ٤ إلى ٥ تفاحات مبشورة جيدًا مع القشر يوميًّا، (يُنصح بترك التفاح بعد تقشيره حتى يتحول إلى اللون البني)، حيث ينتحف البكتيريا الموجودة في التفاح في الأمعاء وبالتالي يعمل على تقليل الإسهال.
- تجنبي تناول الأطعمة التي تحفز عملية الهضم بصورة مفرطة (مثل الملفوف والتوابل الحارة).
- تجنبي الأطعمة التي تساعد على انتفاخ الأمعاء.
- احرصي على شرب حوالي ٢ إلى ٣ لترات من الماء يوميًّا لتعويض فقدان السوائل، ويفضل تناول المياه المعدنية أو الشاي الأخضر، ومن المستحب استعمال محلول معالجة الجفاف من الصيدلية في حالة الإسهال الشديد.
- تجنبي تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول وتتجنبي تدخين السجائر.



يسbib الإسهال فقدان السوائل  
بصورة كبيرة؛ لذا يجب تعويض  
ذلك عن طريق تناول كميات  
كافية من المشروبات.

## الإمساك

قد تكون الإصابة بالإمساك أحد الآثار الجانبية المحتملة لتناول العقاقير المشبطة للخلايا، ولكن يمكن أن ينبع أيضًا عن تناول المسكنات القوية، وقد يؤدي الإمساك إلى فقدان الشهية وزيادة الغثيان.

### نصائح لمواجهة الإمساك

- احرصي على تناول كميات كبيرة من الألياف إضافة إلى شرب الكثير من السوائل.
- احرصي على تناول الفواكه المجففة.
- حافظي على ممارسة الرياضة والتحريك بشكل كافي.
- يمكن استعمال الملينات أو الحقن الشرجية بعد استشارة الطبيب.

## الاضطرابات الحسية

يمكن أن تؤدي العقاقير المشبطة للخلايا إلى تخدر اليدين والقدمين، إضافة إلى ذلك قد يكون هناك شعور بوخز أو بحرق، وفي بعض الحالات قد تشعر المريضة بألم في بعض أجزاء الجسم المصابة، إلا أنه على نقيض متلازمة اليد والقدم لا يحدث تغييرات في الجلد.

عادةً ما تتكرر الاضطرابات الحسية، لكنها يمكن أن تستمر لفترة طويلة بعد آخر تسريب.

## نصائح حول الاضطرابات الحسية

- عند الإصابة باضطرابات حسية في الأطراف يكون هناك خطر متزايد للإصابات الخطيرة.
- توخي الحذر عند التعامل مع الأدوات الحادة.
- توخي الحذر عند التعامل مع السوائل والعناصر الساخنة، مثل أجهزة التدفئة.
- يمكن أن تؤدي الاضطرابات الحسية في القدمين إلى السير بطريقة غير مستقرة؛ لذا توخي الحذر عند السير على الأرض غير المستوية.
- احرصي على ارتداء أحذية مريحة وآمنة.
- احرصي على الاستعانة بالأقارب أو أحد المختصين للعناية باليدين والقدمين.
- احرصي على إيلاء اهتمام خاص بشأن نوع الحذاء الخاص بك، ففي بعض الأحيان قد تؤدي الأحذية الضيقة أو الجوارب الملساء إلى الإصابة بتقرحات شديدة.
- يُنصح بممارسة تمارين الحركة بعناية للأطراف المتضررة للحفاظ على ليونتها.

## احتباس السوائل

قد تسبب بعض العقاقير المشبطة للخلايا في احتباس السوائل المؤقت في الأنسجة، ويُمكن أن تظهر أعراض هذا الاحتباٽس في تورم الساقين، كما يُمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن المفاجئ.

## نصائح حول احتباس السوائل

- يمكنك تناول الشاي المجفف بعد استشارة الطبيب.
- يمكن التغلب على احتباس السوائل في الساقين عن طريق ارتداء الجوارب الضاغطة.

## اضطراب الدورة الشهرية

تعاني معظم مريضات سرطان الثدي من اضطراب الدورة الشهرية بسبب العلاج الكيميائي، وحيث أن العلاج يؤثر على وظيفة المبايض، فقد تحدث أعراض انقطاع الطمث.

يعتمد تعافي المبايض بعد انتهاء العلاج الكيميائي على مجموعة متنوعة من العوامل، من بينها نوع العلاج الكيميائي وعمر المريضة؛ وعلى وجه الخصوص فإن النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن ٤٠ عاماً، في بعض الحالات، يعانين من انقطاع الطمث بشكل دائم بعد انتهاء العلاج الكيميائي.

## نصائح حول أعراض انقطاع الطمث

- احرصي على ارتداء الملابس السهلة التي يمكنك خلعها عند الشعور بهبات ساخنة.
- احرصي على ارتداء الملابس القطنية أو الكتانية التي تمتصل العرق.
- استخدمي المكمملات العشبية لعلاج أعراض انقطاع الطمث بعد استشارة الطبيب. وتتجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب، حيث تختلف فعالية العلاجات العشبية بين النساء من يعاني من سرطان الثدي.
- استخدمي المواد المزلقة من الصيدلية في حالة جفاف المهبل، ويمكن أيضًا لزيت الزيتون الطبيعي أن يساعد في ذلك. احرصي على طلب المشورة من الطبيب أو الصيدلي.

## الخصوصية ومنع الإنجاب:

بوجه عام، لا توجد أي موانع طبية بشأن الحمل أو إنجاب الأطفال بعد التداوي بالعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، ومع ذلك يمكن أن يضر العلاج الكيميائي المبايض أو الخصيتين لدرجة أنه قد يؤدي إلى العقم في بعض الحالات، إلا إنه في السنوات الأخيرة تم تطوير علاجات جديدة وتقنيات حديثة خاصة بطبع الإنجاب للحد من تضرر المبايض المرتبط بالعلاج الكيميائي أو لتسهيل تداوي البويضات أو الأنسجة المبيضية والحفاظ عليها في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لذا يرجى التحدث إلى الطبيب إذا كنت ترغبين في الحمل قبل بدء العلاج، ويمكنك أيضًا العثور على المعلومات الازمة على [www.krebsgesellschaft.de](http://www.krebsgesellschaft.de) أو [www.fertiprotekt.com](http://www.fertiprotekt.com).

ينبغي تجنب الحمل أثناء العلاج الكيميائي والعلاج بالهرمونات بسبب زيادة خطر تشوّه الجنين. ويُعد الوافي الذكري وربما أيضًا اللولب من وسائل منع الحمل الآمنة خلال تلك المرحلة، ويفضل استشارة الطبيب بشأن ذلك، وتتجدر الإشارة إلى أنه خلال العلاج الكيميائي، بوجه عام، تتوقف الدورة الشهرية؛ لذلك من النادر، ولكن ليس مستحيلًا تماماً، حدوث الحمل أثناء العلاج الكيميائي؛ لذا يجب دائمًا الحرص على استخدام وسيلة مناسبة لمنع الحمل أثناء فترة العلاج.

## تشخيص سرطان الثدي - الجوانب النفسية

عادةً ما تعاني مريضات سرطان الثدي من حالات نفسية سيئة، حيث تتغير الحياة بهم من يوم إلى آخر. كما يؤثر علاج سرطان الثدي مع العلاج الكيميائي بشدة على الجسم كله، وبالتالي على السلام النفسي للمريضة.

يسهم علم الأورام النفسي في تحسين حالة المرضى المصابة بالأورام بصورة فعالة، لذلك يُنصح به بشدة. وتتجدر الإشارة إلى أنه يقدّم اليوم في جميع العيادات تقريباً. وهناك العديد من الدراسات المختلفة التي تُظهر أن الدعم النفسي والاجتماعي يمكن أن يحسّن نوعية حياة المرضى، حيث يتفق الخبراء حالياً على أن: العناية الجيدة بمرضى السرطان لا تتطلب العلاج الطبي الفعال فحسب، بل أيضاً الدعم النفسي والاجتماعي.

## نصائح حول الرفاهية النفسية



- حاوي الاسترخاء وممارسة الأنشطة المفضلة: كالحصول على تدليك مريح والتنتزه في الهواء الطلق والجلوس مع الأصدقاء في الأماكن العامة في محاولة لتحسين الحالة المزاجية وتشتيت التفكير في المرض.
- تجنبِي الشعور بالخجل حيث أنك لست المسؤولة عن إصابتك بالمرض، وعليك أن تتقبلِي فكرة أنك بحاجة إلى المساعدة.
- احرصي دائمًا على التحدث عما تفضي به نفسك: حيث يمكنك التحدث بشأن مخاوفكِ وقلقكِ ومشاكلكِ مع طبيبكِ الخاص والمريضات الأخريات وأحبابك، كما يمكنك زيارة مجموعة المساعدة الذاتية لمريض سرطان الثدي للحصول على المساعدة، ويمكن العثور على معلومات حول تلك المجموعات على [www.frauenselbsthilfe.de](http://www.frauenselbsthilfe.de) أو [www.krebsinformations-dienst.de/wegweiser](http://www.krebsinformations-dienst.de/wegweiser)
- تجنبِي الخوف والقلق من الجلوس إلى طلب المساعدة النفسية، فأخصائيو الأورام على دراية كاملة بمشكلات مرضى السرطان وقضاياهم ويفكّرُون بهم مساعدتك بشأن التعامل بصورة أفضل مع مرضكِ والأثار الجانبية المرتبطة به. كما يمكنك تقديم دعم قائم لأقاربك فيما يخص النصائح النفسية، ويمكنك أيضًا العثور على نصائح جيدة على [www.ratgeber-krebs.com](http://www.ratgeber-krebs.com).
- حاوي أن تتقبلِي مفهوم أنكِ في وضع صعب، وأنكِ تتلقين العلاج الكيميائي لعلاج السرطان، ومن المؤكد أن هذا الوقت الصعب سينتهي قريباً، وسوف تعودين إلى طبيعتك مرة أخرى.
- طرق الاسترخاء: يتطلب علاج السرطان مجهوداً جسدياً ونفسياً كبيراً، إلا أن طرق الاسترخاء المختلفة، مثل ممارسة تمارين اليوجا أو كيغونغ أو التاي تشى، يمكن أن تساعد على تخفيف الاضطراب الداخلي واستعادة التوازن العاطفي. وتتجدر الإشارة إلى أنه يتم توفير العديد من الدورات التدريبية من قبل التأمين الصحي.
- العلاجات الإبداعية: احرصي على التعبير عن مشاعركِ! حيث قد يساعد التعامل الإبداعي مع أفكاركِ ومشاعركِ في معالجة العديد من الأمراض. كما يُقدم العلاج بالموسيقى أو الرقص أو الكتابة أو الفن من قبل العديد من مراكز تقديم المشورة ومؤسسات المساعدة الذاتية بشأن مرض السرطان، مما قد يساعدكِ على التعامل مع التغيرات النفسية المزعجة.

## النصائح

جوتا هوبن

### **Diagnose KREBS ... was mir jetzt hilft Komplementäre Therapien sinnvoll nutzen**

Schattauer publishers · Stuttgart 2011 · ISBN 978-3-7945-2830-1

ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟ ... تكون الصدمة الأولى بعد تشخيص مرض السرطان عميقه جداً، إلا أنه إضافة إلى دعم الشركاء والأقارب والأصدقاء، يحتاج المريض أن يكون على دراية «كافية» بالمرض وسبل العلاج الفعالة.

ساندرا أوتو

### **Brustkrebs – Hilfe im Bürokratie-Dschungel**

Springer · Berlin - Heidelberg 2015 · ISBN 978-3-662-47072-5

يلخص هذا الدليل غير الطبي جميع المعلومات والخطوات الخاصة بالأمن المالي، ويوضح المسائل الاجتماعية أثناء فترة علاج مرض سرطان الثدي وبعدها.

جوزيف بيوث

### **Gut durch die Krebstherapie – Von Abwehrschwäche bis Zahnfleischbluten: wie Sie Nebenwirkungen und Beschwerden lindern**

Trias · Stuttgart 2009 · ISBN 978-3-8304-3480-1

تعرف مكافحة السرطان مع الإشعاع والعلاج الكيميائي بأنها مؤلمة جداً، وتكون الآثار الجانبية في كثير من الأحيان خطيرة، إلا أنك ستتجدين هنا الدعم المصمم خصيصاً لحالتك.

فريريك بومان

### **Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie**

Springer · Berlin - Heidelberg 2012 · ISBN 978-3-642-25066-8

إن الأثر الإيجابي للرياضة في الوقاية من السرطان معروف جيداً، ومع ذلك أظهرت دراسات الأورام أن التدريب على ممارسة الرياضة يقلل أيضاً من أعراض متلازمة التعب، ويحسن الصحة العقلية، ويحسن نوعية الحياة.



# ملاحظاتك





ملاحظاتك





# ملاحظاتك



## مسرد المصطلحات

**الإجهاض:** نوع من التعب الذي يحدث عادة في العلاج الكيميائي

**استئصال الثدي:** بتر الثدي

**انتكاس محلي:** النمو الأخير للورم في موضعه الأصلي

**تساقط الشعر:** سقوط الشعر، يصاحب العلاج الكيميائي في كثير من الأحيان

**ثدي:** ثدي الأنثى

**خبيث:** ورم خبيث

**درجة الخباثة:** تُشير إلى مدى عدوانية الورم

**سرطان الثدي:** سرطان الثدي

**العلاج الكيميائي التمهيدي (= قبل الجراحة):** العلاج الكيميائي قبل إجراء الجراحة لإنكماش الورم بهدف تحسين قابلية الجراحة

**العلاج الكيميائي المساعد:** العلاج الكيميائي الذي يتم تقديمها بعد الجراحة

**العلاج الكيميائي:** العلاج باستعمال المواد التي قمنع نمو الخلايا (أي النمو الخلوي ولكنه أيضًا يستعمل كمضادات حيوية)

**علم الأورام:** التخصص الطبي الذي يتناول تطوير الأمراض السرطانية وتشخيصها

وعلاجها والوقاية منها

**مضادات القيء:** أدوية للتغلب على القيء والغثيان

**المعالجة الكيميائية الشافية:** العلاج الكيميائي بهدف الشفاء الكامل (على سبيل المثال العلاج الكيميائي المساعد)

**نقال:** نقال سرطانية، انتقال الخلايا السرطانية إلى مناطق الجسم الأخرى، -على سبيل المثال، من الدم والأنسجة

**نقيلة مجهرية:** النقال التي (ما تزال) صغيرة جدًا بحيث لا يمكن الكشف عنها عن

طريق أي أشعة

**النمو الخلوي في الفم:** أدوية العلاج الكيميائي، لأن تكون في شكل أقراص وتحوذ عن

طريق الفم

**الأورام:** الأورام أو تورم الأنسجة الذي يحدث ذلك نتيجة انتشار الخلايا السرطانية، ويسهل على المرض التمييز بين الأورام الخبيثة والأورام الحميدية.

**تكرار الأعراض:** عودة المرض أو الانكماش.

**تقدُّم المرض:** مراحل المرض

**خطة العلاج:** يشار للجرعات ودورة العلاج معاً بخطة العلاج الكيميائي.

**صحة الثدي:** عقيدة صحة الثدي لدى الإناث.

**العلاج الكيميائي الملطف:** العلاج الكيميائي الملطف هو نوع من العلاج ٍمبطيات الخلايا، وهو علاج يهدف إلى تجديد عمر المريض وتحسين نوعية حياته. ويستخدم العلاج الملطف مع الحالات المتقدمة غير المأمول في شفائها.

**العلاجات المساعدة:** هي مجموعة تدابير لدعم العلاجات المقدمة أو جعلها أكثر فعالية (العلاج الكيميائي على سبيل المثال).

**العلاج النظامي:** هو نوع من العلاج يتم فيه توزيع المادة الفعالة عبر الدم لتصل للعضو المصاب، حيث يعالج مرضي السرطان، على سبيل المثال، بالعلاج الكيميائي أو المضاد للهرمونات.

**مبطيات الخلايا:** تعمل المواد النشطة المستخدمة في علاج السرطان، على سبيل المثال، على تثبيط انتشار الخلايا التي تنقسم بسرعة وبصورة متكررة بالإضافة إلى تثبيط نموها.

**هدأة المرض:** تعني هدأة المرض غياب فعالية المرض بصورة كلية أو جزئية.

## مساعدة المرضى على مساعدتهم لأنفسهم

غالبًا ما تكون نصيحة الطبيب وحده غير كافية، فمن الأفضل أن تناول المريضة مشكلات سرطان الثدي مع أخريات يعاني من نفس المرض.

إذ يساعد كثيًراً مشاركة المشكلات والتحدث مع أخريات يعاني من نفس الأعراض، وخاصة في حالة مرض سرطان الثدي، حيث تنتشر سبل المساعدة الشخصية في ألمانيا؛ لذا تم إدراج العناوين والروابط أدناه.

مركز مساعدة النساء لأنفسهن بعد الإصابة بمرض سرطان الثدي  
“بيت مساعدة مريضات السرطان لأنفسهن”

40 شارع توماس-مان

بون 53111

هاتف: + 49 (0) 228 / 33 889 – 402

فاكس: + 49 (0) 228 / 33 889 – 401

[www.frauenselbsthilfe.de](http://www.frauenselbsthilfe.de)

قسم الأمهات - مركز المرأة وأبحاث مكافحة السرطان

صندوق بريد 31 02 20

أوغسبورغ 86063

هاتف: + 49 (0) 821 / 5213 - 144

فاكس: + 49 (0) 821 / 5213 - 143

[www.mamazone.de](http://www.mamazone.de)

مركز أوبر دين بيرج

هو مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تحسين نوعية حياة مرضى السرطان من خلال ممارسة الرياضة

والأنشطة المختلفة

48 شارع كايزر - أوتو

بولهایم 50259

هاتف: + 49 (0) 2234 981 72 66

[www.überdenberg.de](http://www.überdenberg.de)

## المعلومات والمشورة

### مركز سرطان الثدي في ألمانيا

7 شارع ليزه مايتز

85662 هوهنبرون (منطقة ميونخ)

الهاتف: 00 49 (0) 89 / 41 61 98 00

فاكس: 00 49 (0) 89 / 41 61 98 01

الخط الساخن المجاني: 0800 0 117 112

البريد الإلكتروني: info@brustkrebsdeutschland.de

[www.brustkrebsdeutschland.de](http://www.brustkrebsdeutschland.de)

### جمعية السرطان الألمانية

8 شارع كونو فيشر

برلين 14057

الهاتف: + 49 (0) 30 322932-90

فاكس: + 49 (0) 30 3229329-66

[www.krebsgesellschaft.de](http://www.krebsgesellschaft.de)

### مركز معلومات

### مركز أبحاث السرطان الألماني

في نيوهايمير فيلد 280

69120 هايدلبرغ

الخط الساخن المجاني: + 49 (0) 800 / 420 30 40

[www.krebsinformationsdienst.de](http://www.krebsinformationsdienst.de)

### مركز دعم مرضى السرطان في ألمانيا

32 شارع بوش

بون 53113

هاتف: + 49 (0) 800 / 80 70 88 77 (مجاني)

- إلى الجمعية

من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً

[www.infonetz-krebs.de](http://www.infonetz-krebs.de)

## النمسا

### جمعية مساعدة مرضى السرطان النمساوية

توتسلين 19

فيينا AT-1010

هاتف: + 43 (0) 1 / 796 64 50

فاكس: + 43 (0) 1 / 796 64 50-9

[www.krebshilfe.net](http://www.krebshilfe.net)

## سويسرا

### الاتحاد السوissري لعلاج السرطان

شارع أيفينجير 40

بيرن CH-3001

هاتف: + 41 (0) 31 389 91 00

فاكس: + 41 (0) 31 389 91 60

[info@krebsliga.ch](mailto:info@krebsliga.ch)

## خط المساعدة

الخط الساخن المجاني: + 41 (0) 800 11 88 11

البريد الإلكتروني: [helpline@krebsliga.ch](mailto:helpline@krebsliga.ch)

الم المنتدى: [www.krebsforum.ch](http://www.krebsforum.ch)